

# ዘርን ከኤም ኤል ኤን ነጻ ለማድረግ የሚወሰዱ አስራ ሁለቱ እርምጃዎች

ኤም ኤል ኤን በሽታ በቆሎን የሚያጠቃ የሻይረስ በሽታ ነው። የኤም ኤል ኤን በሽታ መንስኤ የሚሸ ክሎሪቲክ ሞታል ሻይረስ ከሌላ ሻይረስ ለምሳሌ ሹገርኬን ሞዛይክ ሻይረስ ፣ሚዝ ዱዋርፍ ሞዛይክ ሻይረስ ፣ወይንም ከዊት ስትሪክ ሞዛይክ ሻይረስ በጋራ የሚከሰት በሽታ ነው።

- 1**  
መሬቱን ከመዝራት በፊት የመሬቱን የአስተራረስ እና የበሽታ ታሪክ ማጥናት።
- 2**  
በቂ የሆነ የአፈር የአፈር ለምነት ደረጃ መጠበቅ የአዝርዕቱን ጤንነት ለማረጋገጥ ይረዳል። አፈሩን በየሶስት አመት መፈተሽ ማዳበሪያ ለመምረጥ ያግዛል።
- 3**  
ቀጣይ ለሆነ የዘር ብዜት ማረጋገጫ የተሰጠውን እና ከኤም ኤል ኤን በሽታ ነጻ የሆነ ዘር ይጠቀሙ።
- 4**  
የኤም ኤል ኤን ብክለትን ለማስቀረት ማንኛውንም የእርሻ መሳሪያ ከመጠቀም በፊት እና ከተጠቀሙ በኋላ በአግባቡ ያጽዱ ።
- 5**  
ዝናብ መዝነብ እንደጀመረ ወዲያውኑ መዝራት ከበሽታዎ ማምለጥን ያፋጥናል ።
- 6**  
የበሽታ አሳተላላፊ ነፋሳት በማሳወ መከሰታቸውን ለማወቅ በበየጊዜው መከታተል፤ እንደ ሳር፣አረም እና ሌሎች መደበቂያ ሊሆኑ የሚችሉትን ማስወገድ።

## የኤም ኤል ኤን በሽታ ምልክቶች:

- ከባድ የሆነ ክሎሪሲስ(ቅጠሎቹ አረንጓዴ ቀለማቸውን ማጣት) እና ሊፍ ክሎሪስስ
- መካከኑት ወይንም የአበባ ዱቄት አለመግምረት
- በጣም አናሳ ወይንም ምንም የበቆሎ ፍሬ አለመያዝ
- የበቆሎው ልባስ ያለጊዜው መድረቅ
- የመሞት ምልክት
- የበቆሎው እራስ መበስበስ

- 7**  
በሚመከሩ ኬሚካሎች የበሽታዎ አስተላላፊዎች መቆጣጠር ።
- 8**  
የኤም ኤል ኤን በሽታ ምልክቶች የታየባቸውን ከማሳወ ውጭ ማቃጠል ወይንም መቅበር ።
- 9**  
ከተጠረጠሩ ተክሎች ናሙና ወስዶ ምርመራ ማካሄድ፤ እያንዳንዱን ናሙና ከወሰዱ በኋላ የቅጠል መቁረጫውን መድኃኒት መርጫት ።
- 10**  
የኤም ኤል ኤን አምጫ ሻይረስ ለማወቅ የበቆሎ እራስና የድረ ምርት ዘር ናሙና መወሰድ፤ የተበከለውን ዘር ማጥፋት(ማቃጠል) ።
- 11**  
በሽታውን በቶሎ ለመቆጣጠር፤የተባይ ማጥፊያውን በሚመከረው አሰራር ዘሩ ላይ መጠቀም ።
- 12**  
ለአንድ የዘር ወቅት የጥራ ጥሬ ሰብሎችን በማፈራረቅ መዝራት።በተደጋጋሚ በቆሎን አለመዝራትና ያለበቆሎ ቢያንስ ሁለት ወራት የሚቆይበትን የአሰራር ሁኔታ ማመቻቸት።

## የኤም ኤን ኤል በሽታ የመተላለፊያ መንገዶች

- (ተሸካሚ ነፍሳት) ለምሳሌ ትሪፕስ፣ አፈድስ፣ጢንዚዛዎች እና የስራስር
- እንስሳት ፣ሰዎች ፣ የእርሻ መገልገያ ማሽነሪዎችና ቁሳቁሶች ከተበከለ የእርሻ መሬት በእንቅስቃሴ ወቅት
  - የኤም ኤን ኤል በሽታ ዘር ወለድም ሊሆን ይችላል።